

	AOK	LKK	BKK	IKK	VdAK	AEV	Knappschaft	UV*)
Gebühr- frei								
Geb.- Pfl.	Name, Vorname des Versicherten							
noctu	geb. am							
Sonstige								
Unfall	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.			Status			
Arbeits- unfall	Vertragsarzt-Nr.	VK gültig bis			Datum			



Postfach 2238, 90712 Fürth  
 Tel. 0911 740 66 20  
 Fax 0911 740 66 21  
[freiheit@recamed.de](mailto:freiheit@recamed.de)  
[www.recamed.de](http://www.recamed.de)

## Verordnung RECA care - Analtampon

Hilfsmittelverzeichnis Nr. 15.25.17.0003 + 0004

€ 1275



Verordnungszeitraum: .....

Bitte ankreuzen:		Stückzahl:	PZN:
<input type="checkbox"/>	<b>RECA care Testset</b> (zur Erprobung, inkl. Einführstab)	<b>1 St.</b>	<b>1350877</b>
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 20/3	50 St. 2421183
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 20/3	100 St. 8643453
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 20/4	50 St. 2421208
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 20/4	100 St. 8643476
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 40/24	50 St. 2075692
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 40/24	100 St. 2075700
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 40/30	50 St. 2075717
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 40/30	100 St. 2075723
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 40/35	50 St. 2075746
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 40/35	100 St. 2075752
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 44/24	50 St. 2075769
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 44/24	100 St. 2075775
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 44/35	50 St. 2075781
<input type="checkbox"/>	RECA care Tampon	Art. Nr. 44/35	100 St. 2075798
<input type="checkbox"/>	RECA care Einführstab	Art. Nr. 30/1	1 St.

Der Patient benötigt **RECA care** - Analtampons aufgrund von Stuhlinkontinenz wegen:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> permanenter Schließmuskelschwäche   | <input type="checkbox"/> Querschnittslähmung                |
| <input type="checkbox"/> Dekubitus oder Dekubitusprophylaxe  | <input type="checkbox"/> Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa     |
| <input type="checkbox"/> Unterstützung für Sphinktertraining | <input type="checkbox"/> Schlaganfall, MS, Diabetes         |
| <input type="checkbox"/> Meningomyelozele (Spina bifida)     | <input type="checkbox"/> Operations- oder Strahlungsschäden |
| <input type="checkbox"/> Alzheimer                           |   |

Da es durch diese Erkrankung zu unkontrollierten Stuhlentleerungen kommt, ist der Gebrauch von **RECA care** Analtampons erforderlich. Mit deren Hilfe kann der Patient jeweils für mehrere Stunden kontinent und sauber bleiben. Die durch Stuhlinkontinenz entstehenden psychischen Probleme werden gemindert und Ausscheidungen können wieder kontrolliert werden. Die Gefahr von Dekubitusgeschwüren wird verringert und die Pflege des Betroffenen erleichtert.

.....  
 Datum, Stempel, Unterschrift des Arztes